

*Халадова Лиана Магамедовна,  
студентка 3 курса специалитета,  
факультет Лечебное дело  
Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия  
Россия, г. Владикавказ  
e-mail: khaladova.liana@gmail.com*

*Мусаева Иман Исламовна  
студентка 3 курса специалитета,  
факультет Лечебное дело  
Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия  
Россия, г. Владикавказ*

*Научный руководитель: Дзахов Владимир Русланович,  
ассистент кафедры хирургических болезней  
Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия  
Россия, г. Владикавказ*

## **ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПЕПТИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ В РСО-АЛАНИЯ В 2018-2021 ГГ**

***Аннотация:** Пептические язвы — это открытые язвы, которые развиваются на внутренней оболочке желудка и верхней части тонкой кишки. Наиболее распространенным симптомом пептической язвы является боль в животе. К пептическим язвам относят: язвы желудка, возникающие внутри желудка, и язвы двенадцатиперстной кишки, возникающие внутри верхней части тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки). По данным мировой статистики, 6–10% взрослого населения страдают язвенной болезнью. По данным Минздрава РФ, в нашей стране на учете с ЯБ состоит около 3 млн больных, из них каждый десятый был оперирован. Наиболее частыми причинами пептических язв являются инфицирование бактерией *Helicobacter pylori* (*H. Pylori*) и длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен (Адвил, Мотрин IB, другие) и напроксен натрия (Алеве), а также стресс и острая пища.*

***Ключевые слова:** язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, статистика, заболевание.*

*Khaladova Liana Magamedovna,  
3rd year student of the specialty,  
Faculty of Medical Science  
North Ossetian State Medical Academy,  
Russia, Vladicavcaz*

*Musaeva Iman Islamovna  
3rd year student of the specialty,  
Faculty of Medical Science  
North Ossetian State Medical Academy,  
Russia, Vladicavcaz*

*Scientific adviser: Dzakhov Vladimir Ruslanovich,  
assistant of the Department of Surgical Diseases  
North Ossetian State Medical Academy,  
Russia, Vladicavcaz*

## **INCIDENCE OF PEPTIC ULCERS IN RNO-ALANIA IN 2018-2021**

**Abstract:** *Peptic ulcers are open sores that develop on the inner lining of the stomach and upper part of the small intestine. The most common symptom of a peptic ulcer is abdominal pain. Peptic ulcers include: stomach ulcers, which occur inside the stomach, and duodenal ulcers, which occur inside the upper part of the small intestine (duodenum). According to world statistics, 6-10% of the adult population suffer peptic ulcer. According to the Ministry of Health of the Russian Federation, in our country about 3 million patients are registered with PU, of which every tenth was operated on. The most common causes of peptic ulcers are infection with the bacterium *Helicobacter pylori* (*H. Pylori*) and long-term use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen (Advil, Motrin IB, others) and naproxen sodium (Aleve), as well as stress and spicy food.*

**Key words:** stomach ulcer, duodenal ulcer, statistics, disease.

*Основное содержание:*

В ходе статистического исследования архивных данных хирургического отделения КБ СОГМА в период 2018-2021 годов было обработано 104 истории болезней с диагнозом язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки [1]. При статистической обработке проводилось определение средней арифметической и стандартного отклонения [2-4]. Достоверность оценки признаков оценивалась по критерию помощи Стьюдента. Анализ трендов проводился в программе MS Excel по методу скользящей средней.

Результаты исследования. Язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки чаще страдали мужчины (62,9%). Пик заболеваемости у мужчин приходился на период 33 лет, у женщин – 40 лет. На

начальных стадиях заболевания бессимптомное течение отмечено у 80,4% больных. Чаще всего пациенты жаловались на боли в эпигастральной области (69,7%), постоянное недомогание и усталость (50,9%), ухудшение аппетита (43,1%), потерю веса (48,2%), лихорадку (13,4%) Среди больных 38 женщин, 66 мужчин. Средний возраст пациентов составил 35 лет.

Выводы. Учитывая широкий арсенал современных методов диагностики, необходимо создать группы риска по язвенной болезни и проводить их диспансерное наблюдение, что позволит выявить язвы на ранних стадиях и улучшить результаты лечения

#### Список литературы:

1. Власюк В.Б. Лечение осложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки: современные тенденции в терапевтической и хирургической практике. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: <https://www.eurolab-portal.ru/encyclopedia/565/5612/> (дата обращения: 13.08.2022 г.).
2. Гришина Л.П., Анчеева Т.И. Особенности общего контингента инвалидов вследствие заболеваний органов пищеварения в Москве // Проблемы управления здравоохранением. 2002. № 4. С. 43–44.
3. Гурин Н.Н., Логунов К.В. Выбор метода лечения язв желудка. СПб.: МАПО; ИКФ «Фолиант», 2001. 173 с.
4. Дегтярева И.И., Харченко Н.В. Язвенная болезнь. Киев: Здоров'я, 1995. 336 с.